ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 202 /TB-UBND	*Phường Lý Văn Lâm, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Hướng dẫn xử lý, chăm sóc cây lúa trên đất nuôi tôm bị ngộ độc mặn vụ lúa – tôm năm 2026-2027 trên địa bàn phường Lý Văn Lâm

Thực hiện Công văn số 1060/TBVTV ngày 29/10/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh về việc hướng dẫn xử lý, chăm sóc lúa trên đất nuôi tôm bị ngộ độc mặn.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại và giúp cây lúa phục hồi, sinh trưởng, phát triển tốt trong vụ lúa – tôm năm 2026–2027; UBND phường Lý Văn Lâm thông báo, hướng dẫn một số biện pháp xử lý, chăm sóc lúa trên đất nuôi tôm bị ngộ độc mặn như sau:

1. Chủ động kiểm tra độ mặn và nguồn nước

Trung tâm Công ích chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Trưởng các khóm thường xuyên tổ chức thăm đồng, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của các trà lúa trên địa bàn; kịp thời phát hiện những diện tích lúa có biểu hiện bất thường để hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.

Trưởng các khóm thông báo, tuyên truyền, vận động bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây lúa; đồng thời, kiểm tra độ mặn trong ruộng và nguồn nước tại sông, kênh trước khi đưa nước vào ruộng.

Bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, tình hình mưa, nắng nóng và diễn biến xâm nhập mặn để chủ động có biện pháp ứng phó phù hợp.

Khi có nguồn nước ngọt, bà con nông dân cần tranh thủ lấy nước vào ruộng để rửa mặn, duy trì độ ẩm đất và hạn chế muối tích tụ trong đất.

2. Chủ động rửa mặn cho ruộng lúa

Ngay từ đầu vụ, khi có đủ nguồn nước ngọt, bà con nông dân chủ động đưa nước vào ruộng, ngâm từ 2–3 ngày rồi tháo cạn; thực hiện khoảng 2–3 lần tùy điều kiện thực tế nhằm giảm độ mặn trong đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển.

3. Nhận biết cây lúa bị ngộ độc mặn

Bà con nông dân cần chú ý một số biểu hiện thường gặp khi cây lúa bị ngộ độc mặn như sau:

Chóp lá lúa bị khô, quắn lại và cháy dần xuống phía dưới.

Lá non có thể chuyển sang màu trắng hoặc vàng cam.

Trên gân lá xuất hiện nhiều vệt màu nâu đỏ.

Rễ lúa suy yếu, kém phát triển, làm giảm khả năng hút nước và chất dinh dưỡng.

Cây lúa sinh trưởng chậm, giảm khả năng đẻ nhánh, cây ngày càng suy yếu.

Trường hợp nặng có thể làm cây chết; ở giai đoạn lúa trổ bông, ngộ độc mặn còn làm giảm khả năng thụ phấn, ảnh hưởng đến năng suất.

4. Xử lý, chăm sóc khi lúa có biểu hiện ngộ độc mặn

Đối với ruộng lúa ở giai đoạn mạ – đẻ nhánh: Khi có đủ nguồn nước ngọt, bà con đưa nước vào ruộng, duy trì mực nước phù hợp, tránh ngập sâu gây ảnh hưởng đến cây mạ; ngâm nước khoảng 2–3 ngày rồi tháo nước, sau đó bổ sung nước ngọt trở lại.

Việc thay nước nên thực hiện 2–3 lần trong 30 ngày sau sạ, tùy điều kiện nguồn nước và mức độ nhiễm mặn. Chỉ tiến hành bón phân đợt 1 khi cây lúa đã sinh trưởng ổn định và có dấu hiệu phục hồi.

Trường hợp ruộng bị khô nước: Khi nguồn nước sông, kênh có độ mặn dưới 2‰, có thể xem xét đưa nước vào ruộng để duy trì độ ẩm, hạn chế muối tích tụ trong đất. Mực nước cần điều chỉnh phù hợp với chiều cao cây lúa, không để ngập sâu gây hại cây mạ.

Có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm stress cho cây lúa theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm, như sản phẩm chứa hoạt chất Brassinolide hoặc bón Super Humic với liều lượng 1,0–2,0 kg/ha; trường hợp áp dụng biện pháp phun qua lá phân KNO_3 thì sử dụng liều lượng 1,0–1,5 kg/ha trước khi bơm nước lợ vào ruộng 01 ngày theo hướng dẫn chuyên môn.

5. Biện pháp hỗ trợ phục hồi đối với ruộng nhiễm mặn dưới 3‰

Đối với những diện tích ruộng bị nhiễm mặn dưới 3‰, khi phát hiện cây lúa có biểu hiện ngộ độc mặn như cháy chóp lá, khô đọt non, chóp đọt non có biểu hiện trắng hoặc chết cây, bà con cần khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:

Trường hợp sử dụng vôi: Bón vôi CaO hoặc $CaSO_4$ với liều lượng 300–350 kg/ha. Sau khi bón vôi khoảng 2–3 đêm, tiến hành rút cạn nước ruộng để đưa lượng mặn trong ruộng ra ngoài và thay nước mới.

Trường hợp không sử dụng vôi: Tháo cạn nước ruộng, sau đó bơm nước trở lại; đồng thời bổ sung sản phẩm điều hòa sinh trưởng hỗ trợ giảm stress có hoạt chất Brassinolide hoặc bón Super Humic với liều lượng 1,0–2,0 kg/ha, kết hợp bón khoảng 300 kg/ha phân lân theo hướng dẫn kỹ thuật.

Sau khoảng 05 ngày, bà con kiểm tra nếu thấy cây lúa ra lá mới và rễ mới thì đó là dấu hiệu cho thấy cây lúa đang phục hồi.

Ngoài ra, để giúp cây lúa phục hồi nhanh và đẻ chồi mạnh, có thể phun định kỳ 5–7 ngày/lần các chế phẩm tăng cường khả năng chống chịu mặn có hoạt chất Brassinosteroid hoặc các loại phân bón lá theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

6. Tận dụng nguồn nước ngọt và chủ động dự trữ nước

Bà con nông dân thường xuyên kiểm tra nguồn nước tại sông, kênh; khi phát hiện có nguồn nước ngọt cần tranh thủ lấy nước vào ruộng nhằm tận dụng nguồn nước ngọt trên kênh và nước mưa sẵn có để rửa mặn.

Trước khi kết thúc mùa mưa, chủ động tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, duy trì độ ẩm đất, hạn chế muối tích tụ và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa trong các giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND phường đề nghị Trung tâm Công ích chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và Trưởng các khóm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bà con nông dân triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kịp thời phát hiện và hướng dẫn biện pháp xử lý đối với những diện tích lúa có biểu hiện ngộ độc mặn, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ sản xuất lúa – tôm vụ mùa 2026–2027 trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (p/h);
- Trung tâm Công ích phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trưởng khóm 5, Lung Dừa, Tắc Thủ;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG LÝ VĂN LÂM T. CÀ MAU

Lê Quốc Dương